

1. **Am ersten Tag** ein Schmerzäpfchen/Saft nach Körpergewicht nach 6 Stunden, sonst bei Bedarf
2. Wenn der Verband am gleichen Tag abgefallen sein sollte dann bitte auf die Wunde Panthenol-Creme auftragen und mit einer Kompresse versorgen.! am folgenden Tag nach Beschneidung bitte entfernen Sie den Verband und spülen Sie die Wunde mit lauwarmem Wasser.
3. **ACHTUNG:** ab dem nächsten. Tag kein Verband oder Kompresse mehr, wenn dann nur nach Rücksprache mit dem Arzt!!!
4. **Zur Wundpflege** : Nach 24 Stunden nach Beschneidung für 6 Tage 3x am Tag Panthenol-Creme auftragen.

Bitte die Windel nur locker anlegen, um **Verklebung und Hautaustrocknung mit der Folge einer Blutung zu vermeiden**,

5. **um Verklebungen zu vermeiden**, 24 Stunden nach der Beschneidung, bei jedem Windelwechsel ziehen Sie bitte die Haut ca. 2-3mm von der Eichel Richtung Bauch für die nächsten 3 Tage
6. **Zur Vermeidung von Pilz- und Bakterienbefall**, bitte die feuchten Windel unbedingt ständig wechseln, **besonders in der Nacht**.
7. **Sitzbäder**: 2x am Tag für 10 bis 15 Minuten 48 Stunden nach Beschneidung. 1 Liter lauwarmes Wasser und Messerspitze Kochsalz, dabei sollten alle Beläge im Wundbereich gut gespült und mit Wattestäbchen vorsichtig gesäubert werden



8. ab Tag 7 nach der Beschneidung kann das Kind **gebadet** werden. Am Ende den Genitalbereich mit klarem Wasser von Seifenresten abspülen.
9. *** Schwellungen der Wundränder und Eichel in den ersten Tagen bis ca. 2 Wochen wären in Maßen normal, auch **bläuliche und rötliche** Verfärbungen der Eichel sind am Anfang zu erwarten, wenn Sie nicht sicher sind bitte den Arzt informieren

In Notfällen wie Blutung, Fieber und Harnverhaltung...etc. bitte das Kind in der Notaufnahme eines Krankenhauses vorstellen